



Flächendesinfektionsset

bei behördlich angewiesener Desinfektion, im Rettungsdienst und Katastrophenschutz

- Anwendungsgebiete:** Zur geruchsminimierten und materialschonenden Flächendesinfektion
- Zusammensetzung:** 100 ml Wofasteril enthalten als Wirkstoff ca. 40 g Acetylhydroperoxid sowie Wasserstoffperoxid, Essigsäure und desensibilisierende Anteile.
100 ml Pufferlösung enthalten 7,5 ml alcapur. Entspricht ca. 1% Natriumhydroxid und weniger als 1% amphotere und anionische Tenside.
- Anwendung / Dosierung:** Zwei Flaschen Wofasteril (à 125ml) werden in den Kanister Pufferlösung gegossen. Der Kanister mit der Pufferlösung wird gut verschlossen und einmal gut durchgeschüttelt. Anschließend den Kanister aufschrauben und belüften.
Die gebrauchsfertige 2,5 %ige gepufferte Wofasteril-Desinfektionslösung kann bei behördlich ausgewiesener Desinfektion nach RKI eingesetzt werden (Einwirkzeit: 4h). **Wirkt auch gegen Milzbrand!**
Das Flächendesinfektionsset kann auch außerhalb der behördlich angewiesenen Desinfektion analog zum Wofasteril Kombiverfahren eingesetzt werden. Hierbei ist auf Grund der höheren Konzentration im Flächendesinfektionsset eine deutliche Wirkungsreserve vorhanden:
- | | |
|--|---------|
| Bakterizidie (hohe organische Belastung): | 5 min, |
| Fungizidie (einschließlich Aspergillus niger): | 5 min, |
| Tuberkulozidie (hohe organische Belastung): | 60 min, |
| volle Viruzidie (hohe organische Belastung): | 15 min. |
- Materialverträglichkeit:** Vor dem Einsatz des Produktes empfehlen wir die Prüfung der Materialverträglichkeit. An einer unauffälligen Stelle wird das Produkt in der entsprechenden Konzentration aufgetragen.
Durch die Pufferung der Acetylhydroperoxid tritt keine desinfektionsbedingte Korrosion auf.
- Gefahrenhinweise:** Die fertige Desinfektionslösung reizt die Augen und die Haut.
Sicherheitsratschläge: Die fertige Desinfektionslösung darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- Haltbarkeit:** Die gebrauchsfertige 2,5%ige, gepufferte Wofasteril-Desinfektionslösung ist innerhalb von 2-3 Stunden zu verbrauchen. Die einzelnen Komponenten haben eine Haltbarkeit von 1 Jahr.
- Entsorgung:** Nicht verbrauchte Wofasteril-Desinfektionslösung kann mit viel Wasser entsorgt werden.

Packungsinhalt:

Inhalt

2 Flaschen Wofasteril à 125 ml Wofasteril
10 l Kanister Pufferlösung 9,75 l Pufferlösung

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

FKOMBI-PAK 09.10

Es kann keine Gewähr für die Allgemeingültigkeit der Angaben in dieser Produktinformation übernommen werden. Alle Angaben geben unseren Erfahrungsstand wieder; eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.